

## SUPPORT PEDAGOGIQUE N°2

**ERRATA** : une infection sexuellement transmissible (IST) au lieu de maladie sexuellement transmissible (MST).

VIH (Virus de l'immunodéficience Humaine) au lieu de VIH (Virus de l'immuno Humaine)

Infections au lieu de maladies

### IX. LES INFECTIONS AFFERENTES AUX APPAREILS GENITAUX

	LA BLENNORRAGIE	LA SYPHILIS	VIH/SIDA
Définition	La blennorragie ou gonococcie ou chaude de pisse est une infection sexuellement transmissible (IST) provoquant l'inflammation de certaines régions de l'appareil uro-génital.	La syphilis est une infection sexuellement transmissible(IST) se manifestant initialement par un chancre et plus tardivement par des atteintes viscérales et nerveuses.	SIDA (Syndrome d'Immunodéficience Acquis) est une infection sexuellement transmissible (IST).
Agent pathogène	Gonocoque ou Diplocoque	Tréponème pale	VIH (Virus de l'immunodéficience Humaine)
Mode de transmission	Rapport sexuel non protégé avec un(e) partenaire malade	Rapports sexuels non protégés d'une personne infectée à une personne saine ; De la mère à l'enfant au cours de la grossesse (syphilis congénitale) ; Par des aiguilles et des lames contaminées.	Rapports sexuels non protégés d'une personne infectée à une personne saine ; De la mère à l'enfant pendant l'accouchement ou au cours l'allaitement ; Par des aiguilles et des lames contaminées. Par le sang (au cours de la transfusion sanguine)
Symptômes	Les manifestations sont différentes dans les deux sexes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Chez l'homme</u> : démangeaisons au méat urinaire, écoulement purulent verdâtre, sensation de brûlure, miction douloureuse. Céphalées et fièvre, inflammation de l'épididyme et de l'urètre.</li> <li>• <u>Chez la femme</u> : brûlure à la miction, pertes blanches importantes, odorantes et douloureuses, démangeaison à la vulve, col de l'utérus rouge et enflammé.</li> </ul>	Chancre uniquement suintant ou croûteux, apparition sur le corps des tâches arrondies roses (roséoles), chute des cheveux, atteinte des os et du cœur, crises de folie suite à des atteintes du cerveau et stérilité.	Diarrhée rebelle et chronique ; Fièvres prolongées ; Perte considérable de poids (10%) ; Diminution de l'immunité ; Infections opportunistes ; Zona.
Diagnostic	Examen microscopique d'un écoulement urétral pour rechercher les diplocoques	Observation au microscope d'une goutte de sang pour rechercher le germe de la maladie ou faire un test sérologique pour rechercher les anticorps anti syphilis.	Tests sérologiques sur une prise de sang.
Prophylaxie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'abstenir des rapports sexuel avant le mariage ;</li> <li>• Eviter le vagabondage sexuel ;</li> <li>• Rester fidèle à un(e) partenaire ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'abstenir des rapports sexuels avant le mariage ;</li> <li>• Eviter le vagabondage sexuel ;</li> <li>• Rester fidèle à un(e) partenaire ;</li> <li>• Exiger le port des préservatifs lors des</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'abstenir des rapports sexuels ;</li> <li>• Eviter le vagabondage sexuel ;</li> <li>• Rester fidèle à un(e) partenaire ;</li> <li>• Exiger le port des préservatifs lors des rapports sexuels ;</li> <li>• Faire régulièrement les dépistages systématiques ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exiger le port des préservatifs lors des rapports sexuels.</li> </ul>	rapports sexuels.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire des examens prénuptiaux du VIH et prénatal du VIH.</li> </ul>
Traitement	<p>A base d'antibiotiques simultanément entre les deux partenaires. Il ne faut pas faire les rapports sexuels pendant le traitement.</p> <p>NB : Non traité le malade devient stérile.</p>	La syphilis se traite très tôt par les antibiotiques	Il n'existe pas de traitements efficaces contre le VIH/ SIDA, mais juste des médicaments (antirétroviraux). On associe trois médicaments (trithérapie) qui la multiplication et la pénétration des virus dans les cellules.